

Caractéristiques de la maladie de Behçet avec atteinte cutanée en Tunisie : à propos de 114 cas

H. Tounsi , Médecine interne, Hôpital Mohamed Tahar Maamouri - Nabeul, Nabeul, Tunisie
 M. Bouzidi , Médecine interne, Hôpital Mohamed Tahar Maamouri - Nabeul, Nabeul, Tunisie
 W. Skouri, Médecine interne, Hôpital Mohamed Tahar Maamouri - Nabeul, Nabeul, Tunisie
 S. Dghaies, Médecine interne, Hôpital Mohamed Tahar Maamouri - Nabeul, Nabeul, Tunisie
 W. Garbouj, Médecine interne, Hôpital Mohamed Tahar Maamouri - Nabeul, Nabeul, Tunisie
 R. Amri, Médecine interne, Hôpital Mohamed Tahar Maamouri - Nabeul, Nabeul, Tunisie

Introduction

L'atteinte cutanéomuqueuse au cours de la maladie Behçet (MB) est la plus fréquente et facilite le diagnostic de cette vascularite systémique. L'objectif de cette étude était de décrire les particularités de l'atteinte cutanéomuqueuse de la MB dans la région du Cap Bon tunisien.

Patients et méthodes

Etude rétrospective ayant inclus les observations de 114 patients suivis dans notre service de Médecine Interne à l'hôpital Mohamed Tahar Maamouri de Nabeul et répondant aux critères internationaux du diagnostic de la maladie de Behçet, durant la période étalée de 2015 à 2023.

Résultats: Le tableau numéro 1 résume les caractéristiques épidémiologiques de nos patients:


Total des patients	114
Genre ratio (H/F)	2,6
Âge moyen	34,5 ans

Caractéristiques de l'atteinte cutanée: tableau numéro 2:

Aphthose périanale	1 patient
Aphthose buccale	112 patients
Aphthose génitale	92 patients
Cicatrices d'aphtes génitaux	73 patients
Pseudofolliculite	63 patients
Hypersensibilité aux points d'injection	28 patients
Érythème noueux	7 patients
Purpura vasculaire des membres inférieurs	1 patient

Les autres manifestations associées: diagramme 1:

- articulaire
- vasculaire
- oculaire
- neurologique



Traitement: Tous nos patients étaient traités par colchicine avec diminution de la fréquence de récurrence des aphtoses. En termes d'iatrogénie, cinq patients présentaient des effets indésirables à la colchicine à type de : diarrhée dans 3 cas et neutropénie dans 2 cas.

Conclusion

L'atteinte cutanéomuqueuse est la plus fréquente et la plus caractéristique de la maladie de Behçet.

