

Lupus comédonien du cuir chevelu : à propos de 3 cas

Emna , MNIF , Résidente , Service de dermatologie , CHU Hedi Chaker , Sfax , TUNISIE

Rim, CHAABOUNI, AHU, Service de dermatologie , CHU Hedi Chaker , Sfax , TUNISIE

Emna, CHTIOUI, Résidente , Service de dermatologie , CHU Hedi Chaker , Sfax , TUNISIE

Khadija, SELLAMI, PrAg, Service de dermatologie , CHU Hedi Chaker , Sfax , TUNISIE

Fatma, HAMMAMI, AHU , Service de dermatologie , CHU Hedi Chaker , Sfax , TUNISIE

Hamida , TURKI, Prof, Service de dermatologie , CHU Hedi Chaker , Sfax , TUNISIE

Introduction: Le lupus comédonien est une variante du lupus discoïde. Il s'agit d'une entité **rare** avec seulement 24 cas rapportés dans la littérature dont seulement quatre étaient associés à une atteinte du cuir chevelu (CC). Nous étudions ses caractéristiques cliniques et trichoscopiques à travers trois observations cliniques.

Observations cliniques : Trois patientes ont consulté pour des plaques alopéciques du CC, prurigineuses, de couleur brun sale, atrophiques, renfermant des bouchons folliculaires et des comédons.

Cas1: 73 ans, sans ATCDS .

-Plaques hypopigmentées à bordure brune en péribuccal.

-AAN: positifs à 1/1280 avec anti SSA et anti Ro-52 positifs.

Cas2: 48 ans , ATCD de tuberculose ganglionnaire .

-Plaques atrophiques érythémateuses au niveau du front.

-Lymphopénie / thrombopénie.

Les AAN :positifs à 1/640 / typage négatif.

Cas 3: 39 ans.

-Chéilite de la lèvre inférieure et une atteinte de la conque de l'oreille droite.

- AAN positifs à 1/640 avec anti SSa+.

Les anti ADN-natifs étaient négatifs pour toutes les patientes.

Signes trichoscopiques : une perte des orifices folliculaires, un érythème diffus , des gros points jaunes , une pigmentation en pattern moucheté ainsi que des comédons. Une Biopsie du CC: un épiderme atrophique, un infiltrat lymphocytaire péri-annexiel avec présence de bouchons folliculaires et de comédons.

L'immunofluorescence directe : positive pour la deuxième patiente avec dépôt granulaire de C3 au niveau de la jonction dermo-epidermique.

Le diagnostic de lupus comédonien a été retenu pour les 3 patientes.



- Perte des orifices folliculaires → Alopécie cicatricielle
- Erythème
- Gros points jaunes
- Aires de couleur rouge laiteux
- Pigmentation en pattern moucheté ★
- Comédons+++

Trichoscopie



Discussion :

Le lupus comédonien est une variante rare du lupus érythémateux discoïde (LED). Il touche la femme jeune avec 30% de cas associés au lupus érythémateux systémique. La localisation préférentielle est le visage, les oreilles ainsi que les zones photo-exposées. Le prurit est plus fréquent que dans le LED. Le diagnostic repose sur l'histologie qui met en évidence des comédons. La conduite thérapeutique comporte les anti-paludéens de synthèse avec des traitements locaux , sans rémission complète.

